

接種前の注意

- * 当日は、接種を受ける方の日頃の状況をよく知っている保護者が同伴してください。身体の様子が良い時は、次回に延ばしてください。
- * 予診票は、接種をしてくださる医師への大切な情報です。正確に記入してください。

◎次の方は接種前に医師にご相談ください

- * 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害など基礎疾患があ方
- * 過去に予防接種で接種後 2 日以内に発熱、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
- * 過去にけいれん（ひきつけ）をおこしたことがある方
- * 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方もしくは、近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- * 血小板が少ない方や出血しやすい方

接種後の注意

- * 接種後に重いアレルギー症状が起こることがあるので、すぐに帰宅せず、少なくとも 30 分間は安静にしてください。
- * 接種後は、接種部位を軽く押さえ、もまないようにしてください。
- * 接種当日は激しい運動は避けてください。
- * 接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位は清潔に保ち、こすらないようにしてください。
- * 注射した部位が腫れたり痛むことがありますが、体内でウイルス感染に対し防御する仕組みが働くためにおこります。通常は数日間程度で治ります。
- * その他、気になる症状があれば、医師に相談してください。

接種を受けられない方

- * 明らかに発熱している方（通常は 37.5℃を超える場合）
- * 重い急性疾患に罹っている方
- * このワクチンの成分によってアナフィラキシー（通常接種後 30 分以内に出現する呼吸困難や全身のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと）を起こしたことがある方